

Elevage Complémentaire +

Plan d'alimentation : 2 repas/jour

360g/j de poudre consommée au plateau

- Une concentration constante à 60g/L de buvée

Période	Age du veau (jours)	Nombre de repas par jour	Préparation			Distribution	Aliment concentré 1er âge			
			Volume de lait entier (Litres/repas/veau)	Volume d'eau (Litres/repas/veau)	Aliment d'allaitement (grammes/repas/veau)	Volume de buvée (Litres/repas/veau)	Conduite	Consommation attendue (grammes/jour/veau)		
1 ^{ère} semaine	1 - 4 j	2	COLOSTRUM						À volonté	Paille et eau potable à disposition
	5 - 7 j	2	1,27 L	0,64 L	120	2 L	-			
			+ 100 mL d'Euro-Hydrat sur 2 à 3 repas							
2 ^{ème} semaine	8 - 14 j	2	1,58 L	0,80 L	150	2,5 L	15 g			
3 ^{ème} semaine	15 - 21 j	2	1,90 L	0,96 L	180	3,0 L	60 g			
4 ^{ème} semaine	22 - 28 j	2	1,90 L	0,96 L	180	3,0 L	250 g			
5 ^{ème} semaine	29 - 35 j	2	1,90 L	0,96 L	180	3,0 L	400 g			
6 ^{ème} semaine	36 - 42 j	2	1,90 L	0,96 L	180	3,0 L	800 g			
7 ^{ème} semaine	43 - 49 j	2	1,90 L	0,96 L	180	3,0 L	1150 g			
8 ^{ème} semaine	50 - 56 j	2	1,58 L	0,80 L	150	2,5 L	1500 g			
9 ^{ème} semaine	57 - 63 j	2	1,27 L	0,64 L	120	2 L	2100 g			
10 ^{ème} semaine	64 - 70 j	1	1,27 L	0,64 L	120	2 L	2300 g			

Utilisation au seau



Dans un seau propre, mettre la quantité d'eau nécessaire à une température de 50-55°C.

Verser la quantité de poudre pesée et agiter vigoureusement pendant une trentaine de secondes.

Donner à boire à une température de 42-45 °C.

Utilisation au DAL



Régler la température du DAL sur 45°C. Contrôler régulièrement la température et la concentration.



Veiller au nettoyage régulier des bols et tétines

Elevage Complémentaire +

Plan d'alimentation : 2 repas/jour

420g/j de poudre consommée au plateau

➤ Une concentration constante à 60g/L de buvée

Période	Age du veau (jours)	Nombre de repas par jour	Préparation			Distribution	Aliment concentré 1er âge		
			Volume de lait entier (Litres/repas/veau)	Volume d'eau (Litres/repas/veau)	Aliment d'allaitement (grammes/repas/veau)	Volume de buvée (Litres/repas/veau)	Conduite	Consommation attendue (grammes/jour/veau)	
1 ^{ère} semaine	1 - 4 j	2	COLOSTRUM				À volonté	-	
	5 - 7 j	2	1,33 L	0,57 L	120	2 L			
			+ 100 mL d'Euro-Hydrat sur 2 à 3 repas						
2 ^{ème} semaine	8 - 14 j	2	1,87 L	0,71 L	150	2,5 L			15 g
3 ^{ème} semaine	15 - 21 j	2	2,33 L	1 L	210	3,5 L			60 g
4 ^{ème} semaine	22 - 28 j	2	2,33 L	1 L	210	3,5 L			250 g
5 ^{ème} semaine	29 - 35 j	2	2,33 L	1 L	210	3,5 L			400 g
6 ^{ème} semaine	36 - 42 j	2	2,33 L	1 L	210	3,5 L			800 g
7 ^{ème} semaine	43 - 49 j	2	2,33 L	1 L	210	3,5 L			1150 g
8 ^{ème} semaine	50 - 56 j	2	2 L	0,86 L	180	3 L			1500 g
9 ^{ème} semaine	57 - 63 j	2	1,33 L	0,57 L	120	2 L	2100 g		
10 ^{ème} semaine	64 - 70 j	1	1,33 L	0,57 L	120	2 L	2300 g		

Paille et eau potable à disposition

Utilisation au seau



Dans un seau propre, mettre la quantité d'eau nécessaire à une température de 50-55°C.

Verser la quantité de poudre pesée et agiter vigoureusement pendant une trentaine de secondes.

Donner à boire à une température de 42-45 °C.

Utilisation au DAL



Régler la température du DAL sur 45°C. Contrôler régulièrement la température et la concentration.

Veiller au nettoyage régulier des bols et tétines