Bien choisir son plan d'alimentation :

Une poudre de lait peut s'utiliser à plusieurs concentrations et de ce fait avoir plusieurs plans d'alimentation.

Il est essentiel d'avoir un plan d'alimentation qui correspond à votre conduite d'élevage, **n'hésitez pas à demander conseil à votre conseiller**.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour bien définir son plan d'alimentation :

- Le nombre de repas par jour
- L'âge au sevrage
- L'âge au vêlage
- Les problèmes rencontrés sur l'élevage (diarrhées, problèmes respiratoires etc)

De façon générale, plus la quantité de poudre consommée au plateau est élevée, plus vous obtiendrez un GMQ important.

Pour des plans en 1 repas/jour, contactez votre conseiller.

Elevage Pro

780g/j de poudre consommée au plateau

Plan d'alimentation : 2 repas/jour

Concentration : 130g/L d'eau

Utilisation au seau

Dans un seau propre, mettre la quantité d'eau nécessaire à une température de 50-55°C.

Verser la quantité de poudre pesée et agiter vigoureusement pendant une trentaine de secondes.

Donner à boire à une température de 42-45 °C.

Période	Age du veau (jours)	Nombre de repas par jour	Préparation		Distribution	Aliment concentré 1er âge		
			Volume d'eau (Litres/repas/veau)	Aliment d'allaitement (grammes/repas/veau)	Volume de buvée (Litres/repas/veau)	Conduite	Consommation attendue (grammes/jour/veau)	
1ère semaine	1 - 4 j	2	COLOSTRUM			À volonté	-	Paille et eau potable à disposition
	5 - 7 j	2	2 L	**260**	**2,2 L**			
			+ 100 mL of Euro-Hydrat on 2 to 3 meals					
2ème semaine	8 - 14 j	2	2,5 L	**325**	**2,8 L**		15 g	
3ème semaine	15 - 21 j	2	3 L	**390**	**3,3 L**		60 g	
4ème semaine	22 - 28 j	2	3 L	**390**	**3,3 L**		250 g	
5ème semaine	29 - 35 j	2	3 L	**390**	**3,3 L**		400 g	
6ème semaine	36 - 42 j	2	3 L	**390**	**3,3 L**		800 g	
7ème semaine	43 - 49 j	2	3 L	**390**	**3,3 L**		1150 g	
8ème semaine	50 - 56 j	2	2 L	**260**	**2,1 L**		1500 g	
9ème semaine	57 - 63 j	1	2 L	**260**	**2,1 L**		2100 g	
10ème semaine	64 - 70 j	SEVRAGE					2300 g	

Utilisation au DAL

Régler la température du DAL sur 45°C. Contrôler régulièrement la température et la concentration.

Veiller au nettoyage régulier des bols et tétines

Période	Age du veau (jours)	Volume d'eau (Litres/jour/veau)	Concentration (grammes/Litres d'eau)	Volume de buvée (Litres/jour/veau)
1ère période	5 - 20 j	3,6 à 5,4 L	120 à 130	4 à 6 L
2ème période	21 - 46 j	5,4 L	130	6 L
3ème période	47 - 63 j	5,4 à 0 L	130	6 à 0 L
SEVRAGE				

Elevage Pro

960g/j de poudre consommée au plateau

Plan d'alimentation : 2 repas/jour

Concentration : 150g/L d'eau

Utilisation au seau

Dans un seau propre, mettre la quantité d'eau nécessaire à une température de 50-55°C.

Verser la quantité de poudre pesée et agiter vigoureusement pendant une trentaine de secondes.

Donner à boire à une température de 42-45 °C.

Période	Age du veau (jours)	Nombre de repas par jour	Préparation		Distribution	Aliment concentré 1er âge		
			Volume d'eau (Litres/repas/veau)	Aliment d'allaitement (grammes/repas/veau)	Volume de buvée (Litres/repas/veau)	Conduite	Consommation attendue (grammes/jour/veau)	
1ère semaine	1 - 4 j	2	COLOSTRUM			À volonté	-	Paille et eau potable à disposition
	5 - 7 j	2	1,8 L	**270**	**2 L**			
			+ 100 mL d'Euro-Hydrat sur 2 à 3 repas					
2ème semaine	8 - 14 j	2	2,25 L	**340**	**2,5 L**		15 g	
3ème semaine	15 - 21 j	2	3,1 L	**480**	**3,5 L**		60 g	
4ème semaine	22 - 28 j	2	3,1 L	**480**	**3,5 L**		250 g	
5ème semaine	29 - 35 j	2	3,1 L	**480**	**3,5 L**		400 g	
6ème semaine	36 - 42 j	2	3,1 L	**480**	**3,5 L**		800 g	
7ème semaine	43 - 49 j	2	2,7 L	**400**	**3 L**		1150 g	
8ème semaine	50 - 56 j	2	1,8 L	**270**	**2 L**		1500 g	
9ème semaine	57 - 63 j	1	1,8 L	**270**	**2 L**		2100 g	
10ème semaine	64 - 70 j	SEVRAGE					2300 g	

Utilisation au DAL

Régler la température du DAL sur 45°C. Contrôler régulièrement la température et la concentration.

Veiller au nettoyage régulier des bols et tétines

Période	Age du veau (jours)	Volume d'eau (Litres/jour/veau)	Concentration (grammes/Litres d'eau)	Volume de buvée (Litres/jour/veau)
1ère période	5 - 20 j	3,6 à 6,2L	150	4 à 7 L
2ème période	21 - 46 j	6,2 L	150	7 L
3ème période	47 - 63 j	6,2 à 0 L	150	7 à 0 L
SEVRAGE				