

PLAN INDIVIDUEL

PAR BUVEE donc 2 fois par jour :

Age (semaine)	Volume d'eau	Boucherie Unique
1ère semaine	2 L	200 g
2ème semaine	2,75 L	275 g
3ème semaine	3,5 L	380 g
4ème semaine	4,5 L	500 g
5ème semaine	5,25 L	660 g
6ème semaine	5,75 L	750 g
7ème semaine	6,25 L	840 g
8ème semaine	6,75 L	920 g
9ème semaine	6,75 L	980 g
10ème semaine	7 L	1 060 g
11ème semaine	7,25 L	1 120 g
12ème semaine	7,5 L	1 180 g
13ème semaine	7,75 L	1 225 g
14ème semaine	8 L	1 275 g
15ème semaine	8 L	1 325 g
16ème semaine	8 L	1 375 g
17ème semaine	8 L	1 400 g
18ème semaine	8 L	1 475 g
19ème semaine	8 L	1 525 g

Objectif :

2-3 semaines avant abattage : **3kg** de poudre de lait par jour diluer dans 16L d'eau

PLAN CONCENTRATION CONSTANTE*

PAR BUVEE donc 2 fois par jour :

Age (semaine)	Volume d'eau	Boucherie Unique
1ère semaine	2 L	200 g
2ème semaine	2,75 L	275 g
3ème semaine	3,5 L	440 g
4ème semaine	4,5 L	560 g
5ème semaine	5,25 L	680 g
6ème semaine	5,75 L	750 g
7ème semaine	6,25 L	900 g
8ème semaine	6,75 L	1080 g
9ème semaine	6,75 L	1150 g
10ème semaine	7 L	1190 g
11ème semaine	7,25 L	1230 g
12ème semaine	7,5 L	1275 g
13ème semaine	7,75 L	1320 g
14ème semaine	8 L	1360 g
15ème semaine	8 L	1360 g
16ème semaine	8 L	1360 g
17ème semaine	8 L	1360 g
18ème semaine	8 L	1360 g
19ème semaine	8 L	1360 g

* Même concentration de poudre de lait à partir de 9 semaines :
170 g / litre d'eau