



# FILM PURPLE

Hygiène et protection des trayons

Trempage prêt à l'emploi après traite

Action longue durée – Film résistant « Effet capote »

Bactéricide - Levuricide

## PROPRIETES

Produit utilisable en agriculture biologique\*

FILM PURPLE est un produit liquide visqueux prêt à l'emploi, à base de CHLORHEXIDINE.  
FILM PURPLE s'utilise en gobelet de trempage

FILM PURPLE contient du gel d'Aloé Vera. L'aloé Vera est reconnu pour ses vertus de régénération cellulaire, qui renforce l'épiderme et prévient les lésions cutanées

La formule de FILM PURPLE, avec un pH neutre, ne dessèche pas l'épiderme, évitant ainsi la formation de gerçures et de crevasses

FILM PURPLE s'utilise aussi bien en été qu'en hiver et contient de l'essence de citronnelle. Protège dans toutes les situations d'élevage, même les plus extrêmes (froid, humidité, chaleur, risque infectieux important de mammites entre animaux)

Grâce à son effet filmogène, FILM PURPLE agit comme véritable barrière physique protégeant ainsi le sphincter jusqu'à la traite » suivante. La « capote » ainsi formée, est visible à l'œil nu et reste sur le trayon jusqu'à la traite suivante. Cette protection filmogène assure une protection physique du trayon face aux agressions bactériennes et environnementales

FILM PURPLE assure la protection microbienne des trayons tout en leur conservant la douceur et la souplesse.

FILM PURPLE est bactéricide (efficace sur les bactéries responsables des mammites) et levuricide

Déclaration à l'inventaire biocide sous le n°72639

## UTILISATION

Immédiatement après la traite :

Tremper chaque trayon avec FILM PURPLE pur, veiller à bien répartir le produit sur chaque trayon


Ne pas essuyer, ne pas rincer, laisser agir au moins 5 minutes (temps nécessaire à la désinfection)

Ne pas laisser l'animal s'allonger juste après l'application du produit

A l'aide d'une lavette unique imprégnée d'une solution nettoyante, éliminer les résidus de produit s'il y a lieu au début de la traite

Bien rincer le matériel à l'eau tiède après utilisation, pour éviter la formation d'un film

Tremper chaque trayon, laisser agir au moins 30 secondes.



Essuyer soigneusement le trayon et la base de la mamelle avec un papier d'essuyage à usage unique.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                    |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect :           | Liquide visqueux opaque violet                                                                                                    |
| pH :               | 6,50 +/- 1,00                                                                                                                     |
| Densité :          | 1,04 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,02                                                                                                   |
| Stockage :         | Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.             |
| TP :               | TP03 - désinfection des trayons hors usage médicament vétérinaire.<br>AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution |
| Substance active : | CHLORHEXIDINE GLUCONATE (N° CAS : 18472-51-0) à 7 g/kg.                                                                           |

## CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

| Souches                      | Norme   | Temps de contact |
|------------------------------|---------|------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> | EN 1656 | 5 minutes        |
| <i>Escherichia coli</i>      |         |                  |
| <i>Streptococcus uberis</i>  |         |                  |

Efficacité levuricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

| Souche                  | Norme   | Temps de contact |
|-------------------------|---------|------------------|
| <i>Candida albicans</i> | EN 1657 | 5 minutes        |

## CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 kg – fût de 60 kg

Le pictogramme ADIVALOR, présent sur le produit, indique que l'emballage usagé peut être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière EVPHEL

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1027) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : [www.agrileader.fr](http://www.agrileader.fr)

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

*Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.*

*\* Produit utilisable en agriculture biologique conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements).*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas mélanger avec d'autres produits désinfectants*

N° de révision : 22/04/2022\_(V0)