



SUPR SPRAY PURPLE

Hygiène et protection des trayons

Pulvérisation après la traite

PROPRIETES

Produit utilisable en agriculture biologique*

SUPR SPRAY PURPLE est un produit liquide prêt à l'emploi, à base de CHLORHEXIDINE.

SUPR SPRAY PURPLE s'utilise en robot de traite, en application par pulvérisation manuelle ou automatique

SUPR SPRAY PURPLE peut également s'utiliser en trempage liquide

La pulvérisation de chaque trayon avec SUPR SPRAY PURPLE apporte hydratation et une protection optimale visible à l'œil nu. Contient de l'essence de citronnelle

SUPR SPRAY PURPLE contient du gel d'Aloé Vera. L'Aloé Vera est reconnu pour ses vertus de régénération cellulaire, qui renforce l'épiderme et prévient des lésions cutanées

La formule de SUPR SPRAY PURPLE, avec son Ph proche de celui de la peau, ne dessèche pas l'épiderme, évitant ainsi la formation de gerçures et de crevasses

SUPR SPRAY PURPLE assure la protection microbienne des trayons tout en leur donnant douceur et souplesse. SUPR SPRAY PURPLE est bactéricide (efficace sur les bactéries responsables des mammites) et levuricide.

Déclaration à l'inventaire biocide sous le N° 72638

UTILISATION

Immédiatement après la traite :

Pulvériser FILM PURPLE pur sur le pis, veiller à bien répartir le produit sur chaque trayon

Ne pas essuyer, ne pas rincer, laisser agir au moins 5 minutes (temps nécessaire à la désinfection)

Éliminer les résidus de produit s'il y a lieu au début de la traite suivante, à l'aide d'une lavette unique imprégnée d'une solution nettoyante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Liquide violet
pH :	6,50 +/- 1,00
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
TP :	TP03 - désinfection des trayons hors usage médicament vétérinaire. AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution
Substance active :	CHLORHEXIDINE GLUCONATE (N° CAS : 18472-51-0) à 5 g/kg.



CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

Souches	Norme	Temps de contact
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 1656	5 minutes
<i>Escherichia coli</i>		
<i>Streptococcus uberis</i>		

Efficacité levuricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

Souche	Norme	Temps de contact
<i>Candida albicans</i>	EN 1657	5 minutes

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 kg – fût de 60 kg

Le pictogramme ADIVALOR, présent sur le produit, indique que l'emballage usagé peut être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière EVPHEL

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1026) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.agrileader.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

** Produit utilisable en agriculture biologique conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements).*

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas mélanger avec d'autres produits désinfectants

N° de révision : 08/03/2022_(V1.3)

