CALIGIENE

SUPR PURPLE

Hygiène et protection des trayons

Trempage après la traite

PROPRIETES

Produit utilisable en agriculture biologique*

SUPR PURPLE est un produit de texture épaisse, prêt à l'emploi, à base de CHLORHEXIDINE.
Sa texture épaissie ne goutte pas et assure ainsi un temps de contact prolongé sur le trayon.

SUPR PURPLE contient des agents surgraissants utilisés en cosmétique :
- du gel d'Aloé Vera, connu pour ses vertus de régénération cellulaire et de cicatrisation,
- de la glycérine aux propriétés humectant et émolliente, améliorant l'élasticité de la peau.

La formule de SUPR PURPLE, avec son pH neutre, ne dessèche pas l'épiderme, évitant ainsi la formation de gerçures et de crevasses.

Le trempage de chaque trayon avec SUPR PURPLE laisse un filme hydratant (action filmogène) pour une protection optimale et visible à l'œil nu.
Contient de l'essence de citronnelle.

SUPR PURPLE assure la protection microbienne des trayons tout en leur donnant douceur et souplesse.
SUPR PURPLE est bactéricide (efficace sur les bactéries responsables des mammites) et levuricide.
Déclaration à l'inventaire biocide sour le N° 72637

UTILISATION

Immédiatement après la traite :
Utiliser un gobelet anti-retour
Remplir le gobelet propre et sec, au ¾
Tremper chaque trayon
Ne pas essuyer, ne pas rincer, laisser agir
Eliminer les résidus de produits s'il y a lieu au début de la traite suivante, à l'aide d'une lavette unique imprégnée d'une solution nettoyante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Liquide épais visqueux violet
pH :	6,5 +/- 1,0
Point de gel :	0 °C
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLU, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Viscosité à 20°C :	Voir la section 9 de la FDS.
TP :	TP03 - désinfection des trayons hors usage médicament vétérinaire. AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution
Substance active :	CHLORHEXIDINE GLUCONATE (N° CAS : 18472-51-0) à 5 g/kg.

CALIGIENE

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traite (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

Souches	Norme	Temps de contact
Staphylococcus aureus	EN 1656	5 minutes
Escherichia coli		
Streptococcus uberis		

Efficacité levuricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traite (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C.

Souche	Norme	Temps de contact
Candida albicans	EN 1657	5 minutes

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traite à 30°C

Souches	Norme	Temps de contact
Escherichia coli	EN 17422	5 minutes
Staphylococcus aureus		

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 kg – fût de 60 kg

Le pictogramme ADIVALOR, présent sur le produit, indique que l'emballage usagé peut être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière EVPHEL

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre antipoison Européen (PCN). Réf 1025.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.agrileader.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

** Produit utilisable en agriculture biologique conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements).*

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision : 12/05/2025_(V4))