

TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR ESPÈCES

ESPÈCES	PÉRIODE DE SEMIS							DOSE DE SEMIS EN PUR ¹	EXIGENCE DE SEMIS
	15/07	01/08	15/08	01/09	15/09	01/10	15/10		
Avoine de printemps	af	af	f	f	af	af	af >	60	Faible
Avoine rude	af	af	f	f	af	af	af >	35	Faible
Blé ou orge	f	f	af	af				80-100	Moyenne
Ray-grass d'Italie	f	f	f	f	f	af	af >	15	Faible
Seigle	f	f	f	f	af	af	af >	60	Moyenne
Seigle multicaule	f	f	f	f	af	af	af >	25	Moyenne
Moha fourrager	f	f	af					15	Élevée
Sorgho fourrager	f	f	af					25	Élevée
Colza	f	f	f	f	f	af		6 ²	Faible
Cameline		f	af					3	Faible
Moutarde blanche		f	f	f				7	Faible
Moutarde brune		f	f	f				3	Faible
Moutarde d'Abyssinie	f	f	f	f	af			6	Faible
Navette fourragère	f	f	f	f	af	af	af >	5	Faible
Radis fourrager	f	f	f	f	af			9	Faible
Radis chinois	f	f	f	f	af			9	Faible
Féverole de printemps	f	f	af					100-200	Élevée
Féverole d'hiver	f	f	af	af	af	f	f > ⁴	100-200 ³	Élevée
Fénugrec	f	f	af					35	Élevée
Gesse	f	f	af					50	Élevée
Lentille fourragère	f	f	af >					40	Élevée
Pois fourrager de printemps	f	f	af >					100	Élevée
Trèfle d'Alexandrie	f	f	af					15	Élevée
Trèfle incarnat	f	f	af >					15	Élevée
Vesce com. de printemps	f	f	af					20-60 ³	Moyenne
Vesce pourpre	f	f	af >					20-60 ³	Moyenne
Vesce velue	f	f	af					20-60 ³	Moyenne
Niger	f	f						8	Moyenne
Tournesol	f	f	af >					4	Élevée
Lin			f					50	Moyenne
Phacélie		af	f	af				7	Élevée
Sarrasin	f	f						40	Élevée

Graminées Crucifères Légumineuses Composées Linacées Hydrophyllacées Polygonacées

PIÉGEAGE NITRATES	STRUCTURATION DU SOL	CONCURRENCE ADVENTICES À L'INSTALLATION	RESTITUTION AZOTE CULTURE SUIVANTE	SENSIBILITÉ AU GEL	FACILITÉ DE DESTRUCTION	COÛT DES SEMENCES
Moyenne	Bonne	Moyenne	Faible	- 10° C	Moyenne	+*
Moyenne	Très bonne	Moyenne	Faible	- 10° C	Moyenne	+++
Moyenne	Bonne	Moyenne	Faible	- 13° C	Difficile	Repousses
Élevée	Bonne	Faible	Faible	- 15° C	Difficile	++
Moyenne	Bonne	Moyenne	Faible	- 13° C	Difficile	+*
Moyenne	Très bonne	Moyenne	Faible	- 13° C	Difficile	+++
Élevée	Très bonne	Élevée	Faible	- 1° C	Facile	+
Élevée	Très bonne	Élevée	Faible	0 à - 2° C	Facile	++
Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne	- 13° C	Difficile	+*
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Faible	- 5 à - 10° C	Facile	+
Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne	- 5 à - 10° C	Facile	+
Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne	- 5 à - 10° C	Facile	+
Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne	- 10° C	Difficile	++
Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne	- 13° C	Difficile	+
Élevée	Très bonne	Élevée	Moyenne	- 10° C	Difficile	++
Élevée	Très bonne	Élevée	Moyenne	- 7° C	Facile	+++
Moyenne	Bonne	Faible	Forte	- 8 à - 10° C	Moyenne	++++
Moyenne	Bonne	Faible	Forte	- 12° C	Difficile	++++
Faible	Moyenne	Élevée	Moyenne	- 5° C	Moyenne	++++
Moyenne	Moyenne	Élevée	Forte	- 5° C	Moyenne	++++
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Forte	- 7° C	Moyenne	++++
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Forte	- 5 à - 10° C	Moyenne	++++
Faible	Moyenne	Faible	Moyenne	- 7° C	Facile	+++
Faible	Moyenne	Moyenne	Forte	- 15° C	Difficile	+++
Moyenne	Moyenne	Élevée	Forte	- 5 à - 10° C	Moyenne	++++
Moyenne	Moyenne	Élevée	Forte	- 5 à - 10° C	Moyenne	++++
Moyenne	Moyenne	Élevée	Forte	- 5 à - 10° C	Moyenne	++++
Élevée	Moyenne	Faible	Faible	0 à - 2° C	Facile	++
Élevée	Moyenne	Faible	Faible	- 2 à - 4° C	Facile	+*
Faible	Moyenne	Faible	Faible	- 7° C	Facile	++
Élevée	En surface	Élevée	Faible	- 7 à - 13° C	Facile	++
Moyenne	Bonne	Moyenne	Faible	- 2 à - 4° C	Facile	++++

f : favorable
af : assez favorable
af > : peut être tenté un peu après cette date
Sources : Fiches couverts végétaux – ARVALIS Institut du Végétal
Choisir et réussir son couvert végétal pendant l'interculture en AB – ITAB

¹ En kg /ha – source : fiches couverts ARVALIS - Institut du Végétal
² Ou repousses
³ Suivant le PMG
⁴ Semi tardif pour un développement au printemps

