




Le trio gagnant : performance/précocité/huile

CARACTÉRISTIQUES

- > PLANTE : moyenne
- > PORT DE CAPITULE : semi-dressé
- > FORME DE CAPITULE : convexe
- > FLORAISON : précoce
- > MATURITÉ : précoce



PERFORMANCE

Nombre d'années	Nombre de lieux	Avantage humidité (%)
4	40	+ 0,2

Source Pioneer® :
En comparaison avec les témoins du marché.



Profil maladies

Sclérotinia collet	Sclérotinia capitule	Phomopsis	Phoma
PS	PS	TPS	PS
Mildiou	Verticillium	Orobanche	
RM9	PS*	>E (Or5 + Syst II)	

POSITIONNEMENT

Comportement EnClass®

STADE				
STRESS	Émergence	Initiation florale	Floraison	Remplissage
Froid	○○○	○○○	○○	○○○
Chaleur	○○	○○○	○○○	○○○
Hydrique	○○○	○○○	○○○	○○○

Dessiccation et Unités Chaleur

	Floraison Précoce		Dessiccation Rapide
--	-----------------------------	--	-------------------------------

Besoins en somme de températures (base 6)

Du semis à la floraison : **820 UC**

Du semis à la récolte : **1 665 UC**

Potentiel parcelle

	Elevé (plus de 30 q/ha)	Bon (25 - 30 q/ha)	Moyen (20 - 25 q/ha)	Faible (inférieur à 20 q/ha)
Adaptation	○○○○	○○○○	○○○	○○○
Densité (gr/ha)	75 000	75 000	70 000	70 000

○ : Non recommandé ○○ : Moyennement adapté ○○○ : Adapté ○○○○ : Parfaitement adapté

TPS : Très Peu Sensible / PS : Peu Sensible / MS : Moyennement Sensible / AS : Assez Sensible / S : Sensible

*données à confirmer.

PRÉCOCE

LINOLÉIQUE

Int@n'Sun™

