

RIVAGE

Monogerme génétique - Triploïde
Jaune orangé

Betterave fourragère



Tolérante rhizomanie



Haut niveau de rendement



**Très bonnes qualités
de conservation au silo**



Facilité de récolte



- Proportion en terre : 60 – 65%
- **Arrachage mécanique très facile**
- **Arrachage manuel facile**
- **Excellente régularité d'implantation et de sortie hors terre**
- Facilité de mécanisation à l'effeuillage
- **Moins de betteraves « scalpées » pour une meilleure conservation au silo et pour plus d'UF à l'auge**

Meilleure appétence à l'auge

- Bon niveau de matière sèche : ~ 16 %
- MS pour des betteraves plus tendres et plus appétentes
- Peu de terre attenante aux racines
- Mécanisation de la récolte simplifiée
- **Meilleure appétence et moins de refus à l'auge**

Betterave fourragère



association
pour le développement
de la betterave fourragère
monogerme

Regroupement des essais betteraves fourragères ADBFM 2011



Type	Variétés	Rendement en Matière Sèche exprimé en % du rendement du type			Rdt racine net/ha 2011	Matière Sèche (moyenne 2011)	Rdt MS/ha 2011
		2009	2010	2011	t / ha	%	t MS/ ha

Sucrières fourragères

CERISE*			100,97	120,20	17,09	20,51
MERVELLE	101,78	100,68	100,78	123,61	16,58	20,47
JAUNA	101,63	97,12	100,73	121,39	16,93	20,46
STARMON*	96,87	98,45	99,10	121,58	16,58	20,13
COLOSSE	99,72	103,75	98,41	129,44	15,45	19,99
Rendement moyen	20,36 t MS/ha	18,86 t MS/ha	20,31 t MS/ha			

Fourragères sucrières

SPLENDIDE	108,56		107,92	134,19	15,72	21,06
RIVAGE*	102,29	105,44	101,10	130,19	15,19	19,73
JAMON	102,19	100,69	101,00	133,65	14,81	19,71
VERMON	94,09	99,14	99,15	125,67	15,44	19,35
TEMOIN RT*	96,64	97,31	95,47	124,18	15,01	18,63
MONBRUN**	96,23	97,42	95,36	123,36	15,09	18,61
Rendement moyen	19,62 t MS/ha	18,10 t MS/ha	19,52 t MS/ha			

Fourragères

MONRO	100,00	100,00	100,00	132,90	13,41	17,81
Rendement moyen	16,91 t MS/ha	16,05 t MS/ha	17,81 t MS/ha			

* Variété résistante à la rhizomanie

** Variété résistante au rhizoctone brun