

## POINTS FORTS

Productif en  
période estivaleSouplesse  
d'exploitationValeur alimentaire  
accrue

# TARDIVO

## Moha fourrager



## Carte d'identité

Nom latin : *Setaria italica*


Précocité : tardif

Epiaison après semis :  
60 - 70 jours

Pérennité : 6 mois

Répartition de production :  
- printemps : 0 %  
- été / automne : 100 %

## &gt;&gt; Positionnement de TARDIVO



- Espèce à forte contribution à la production fourragère
- Espèce d'accompagnement, autre rôle que strictement productif

## &gt;&gt; Conseils d'associations

Fauche ou mixte

- AKENATON

Trèfle d'Alexandrie

## &gt;&gt; Entre dans la composition de

Tous les détails sur  
[www.caussade-semences.com](http://www.caussade-semences.com)



# TARDIVO

Moha fourrager


## Tardif et productif

### Semis

Densité : 25 à 30 kg/ha

Profondeur : 1 à 2 cm

Semer de préférence avant :



### >> Productif en période estivale

TARDIVO est la variété estivale par excellence. Elle est adaptée aux conditions stressantes et permet de produire rapidement (en 60-70 jours) 4 à 6 T de matière sèche en une seule et unique coupe.

### >> Souplesse d'exploitation

L'amélioration de la souplesse d'exploitation de TARDIVO, +20 à 30 jours par rapports aux variétés classiques, permet un rendement/hectare plus important et une gestion plus aisée de la récolte.

### >> Valeur alimentaire accrue

La sélection de ce type de moha fourrager a permis une amélioration de la valeur alimentaire. Des valeurs supérieures de 0,05 UF par rapport aux variétés de mohas classiques sont régulièrement observées. Son épiaison tardive facilite l'exploitation de la plante au stade montaison-fin floraison et permet une récolte optimale.

### Fertilisation

Pour un semis en pur :

Installation :

N : 50 à 70 unités

P : 30 à 50 unités

K : 30 à 50 unités



Tardivo

Presto

Tous les détails sur [www.caussade-semences.com](http://www.caussade-semences.com)



**CAUSSADE**  
semences   
Source de génétique

### >> Conseils de culture

- Semer sur sol ressuyé et suffisamment réchauffé (12° minimum).
- Rouler après le semis.
- Privilégier la fauche à la pâture

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. L'utilisateur devra s'assurer de la conformité de l'utilisation du produit dans le cadre de la réglementation départementale en vigueur. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.